

Slikscreening na CVA

(of andere patiënten bij wie het starten van orale voeding mogelijk onveilig is)

(naam patiënt)	datum:
	verpleegkundige:

Volg de instructie en kruis de pijlen aan zodat de genomen stappen zichtbaar zijn:

Uitgangshouding: de patiënt zit (enigszins) actief. Is de patiënt te moe of te suf om iets te kunnen drinken?

nee

ja

niets per os (npo) en voeding per sonde (of vocht per infuus voor max 24 uur)

/ \ **niet onderzoekbaar** \ /

bij verbetering slikscreening uitvoeren

Slikscreening deel 1:

Neem een beker water en geef de patiënt een heel klein beetje water, bijv. van dessertlepel; minimaal 3x.

Resultaat:

- patiënt verslikt zich fors, al bij kleine beetjes water?
- of patiënt krijgt het water niet weggeslikt en moet heftig hoesten en alles uitspugen?
- of patiënt laat ondanks aansporing het water uit de mond lopen?

nee

ja

- npo en voeding per sonde (of eerst vocht per infuus voor max 24 uur)
- logopedist i.c.

/ \ **= ernstige slikstoornis** \ /

/ \ **= milde slikstoornis** \ /

Slikscreening deel 2:

Laat de patiënt (zelf) enkele grotere slokken nemen of een bekertje water achter elkaar laten leegdrinken.

Resultaat: ja

- patiënt verslikt zich met name bij grotere slokken

ja

slikken is veilig genoeg voor dik vloeibaar, maar is de patiënt **ook voldoende belastbaar** voor volledige orale intake?

Voeding per sonde

nee

ja

- npo en voeding per sonde
- logopedist i.c.

Orale voeding

- orale voeding: start met dikglad vloeibaar
- logopedist i.c.

patiënt verslikt zich niet in grote slokken en kan ook een bekertje water leegdrinken **maar** heeft wèl een facialisparsese (scheve mond)?

ja

- orale voeding: start met gemalen voeding (acute fase) of desgewenst gewone voeding (post-acute fase)
- logopedist i.c. ivm facialisparsese

nee, ook niet

orale voeding: normaal

/ \ **= géén slikstoornis** \ /